



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวสิราณี หอมนาน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๒๒๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๒๒๙)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุชนันต์ กิตติศุภกร)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสิริราณี หอมนาน

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๒๒๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๓๑๑๒๑๖๔๒๓</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๕</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสิราณี หอมนาน

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๒๒๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา มารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรหญิงไทย อายุ ๓๙ ปี สถานภาพสมรสคู่ อาชีพค้าขาย เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี มารดาตั้งครรภ์ที่ ๒ อายุครรภ์ ๓๗ สัปดาห์ ๒ วัน จากผลตรวจอัลตราซาวด์อายุครรภ์ ๓๘ สัปดาห์ ๕ วัน ผ่าครรภ์ที่คลินิก จำนวน ๙ ครั้ง เริ่มผ่าครรภ์เมื่ออายุครรภ์ ๘ สัปดาห์ ๖ วัน ผลการตรวจเลือดขณะผ่าครรภ์ปกติดี มีปัญหาความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ตอนอายุครรภ์ ๓๑สัปดาห์ ๑วัน ความดันโลหิตเท่ากับ ๑๖๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท แพทย์ให้รับประทานยา Methyl dopa ๑ เม็ดหลังอาหารเช้า เย็น เมื่อมาตรวจตามนัดพบว่าความดันโลหิตยังอยู่ในระดับสูง แพทย์จึงเพิ่มปริมาณยาเดิมเป็น ๑ เม็ดรับประทานหลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น จนคลอด ประเมินแรกรับพบความถี่ของการหดรัดตัวของมดลูกทุก ๔ นาที ระยะของการหดรัดตัวนาน ๓๐ วินาที ความรุนแรงของการหดรัดตัวของมดลูกระดับน้อย (+) ติดเครื่องตรวจสถานะทารกในครรภ์ (Electronic Fetal Monitoring : EFM) แผลผลเป็นปกติดี ไม่มีมูกเลือด ไม่มีน้ำเดิน ถุงน้ำคร่ำยังอยู่ (Membranes Impact : MI) อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ ๑๕๔ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิตเท่ากับ ๑๕๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท ไม่มีอาการปวดศีรษะ ตาพร่ามัว แพทย์จึงพิจารณาทำการผ่าตัดคลอดเนื่องจากเคยผ่าคลอดมาก่อน (C/S due to previous c/s with pregnancy induced hypertension) ในวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๙ น.โดยวิธีฉีดยาชาและยาแก้ปวดเข้าไขสันหลัง(Spinal block with morphine) ได้ทารกเพศชาย น้ำหนักแรกเกิด ๓,๒๐๐ กรัม เกณฑ์ให้คะแนนทารกแรกเกิดที่ ๑ นาที และ ๕ นาทีแรก ๙ คะแนน (หักสีผิว ๑ คะแนน) และ ๑๐ คะแนนตามลำดับ ไม่พบการบาดเจ็บ ลักษณะทารกทั่วไปแข็งแรงดี ปริมาณเลือดขณะคลอดในห้องผ่าตัด ๕๐๐ มิลลิลิตร สัญญาณชีพในห้องผ่าตัดมีความดันโลหิตสูง ๑๓๒/๑๐๔ มิลลิเมตรปรอท แพทย์จึงได้ให้ยา Cadipine ๐.๔ mg หลังได้รับยาความดันโลหิตลดลงเหลือ ๑๓๖/๘๒ มิลลิเมตรปรอท ถึง ๑๕๔/ ๙๐ มิลลิเมตรปรอท ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง แกรับย้ายมารดาหลังคลอดจากห้องผ่าตัดวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๑๕ น. มาโดยเปลนอน อาการแรกรับรู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่องหายใจปกติ อุณหภูมิร่างกาย ๓๕.๘ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๐๔ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๖๐/๑๐๐ มิลลิเมตรปรอทไม่มีอาการ ปวดศีรษะหรือตาพร่ามัว ขาทั้ง ๒ ข้างยังมีอาการชา ประเมินแผลผ่าตัดแผลดี ระดับของมดลูกอยู่ระดับสะดือ มดลูกหดรัดตัวดี ประเมินปริมาณเลือดที่ออกทางช่องคลอด ๒๐ มิลลิลิตร ลักษณะเต้านมปกติ หัวนมสั้น ๐.๕ เซนติเมตร น้ำนมไม่ไหล บริเวณลานนมยัดหยุ่นดี ปัสสาวะในถุงออก ๓๐๐ มิลลิลิตร สังเกตอาการทุก ๑๕ นาที ความดันโลหิตลดลงอยู่ที่ ๑๖๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท ถึง ๑๓๐/๑๑๐ มิลลิเมตรปรอท ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากภาวะความดันโลหิตสูง รายงานแพทย์รับทราบได้ให้ยา Acalate ขนาด ๑๐ มิลลิกรัม ๑เม็ดได้กลิ่น ขณะรอลาแพทย์ให้วัดความดันโลหิตทุก ๒ ชั่วโมง ความดันโลหิตลดลงเหลือ ๑๔๔/๘๕ มิลลิเมตรปรอท

ถึง ๑๖๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท แพทย์จึงงดยาลดความดันทุกชนิดให้สังเกตอาการต่อ ขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล มารดาสามารถทำกิจกรรมได้ปกติ ดูแลตนเองและบุตรได้ ค่าความดันโลหิตของมารดาหลังคลอดวัดได้ ๑๔๐/๘๕ มิลลิเมตรปรอท ถึง ๑๖๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท แพทย์พิจารณาให้ Hctz ขนาด ๒๕ มิลลิกรัม ๑ เม็ดหลังอาหารเช้า และกลับไปรับประทานต่อที่บ้าน

ภายหลังผ่าคลอดพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ๔ วัน แผลผ่าตัดดีดี น้ำนมไหลดี มีน้ำคาวปลาสีแดงจางๆ ความดันโลหิตก่อนจำหน่าย ๑๕๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท สามารถดูแลตนเองและให้นมบุตรได้ดี ให้คำแนะนำมารดา และญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังคลอดบุตรต่อเนืองที่บ้าน เรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสม การมาตรวจตามนัด และอาการผิดปกติที่ต้อง มาพบแพทย์ก่อนนัด มารดาได้รับทราบและเข้าใจดี สามารถตอบคำถามได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. มารดาหลังคลอดได้รับการดูแลรักษาและให้การพยาบาลจากสาขาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้มารดาและทารกได้รับความปลอดภัยและผ่านพ้นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้
๒. มารดาหลังคลอดไม่ได้รับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดคลอดบุตร
๓. มารดาหลังคลอดและญาติพึงพอใจในการได้รับบริการจากพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ
๔. มารดาหลังคลอดมีความรู้ในการไปดูแลตนเองต่อที่บ้าน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ผ้าอ้อมอุ่น (ผ้าคลุมให้นมบุตร)

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อป้องกันการเปิดเผยร่างกายมารดาขณะให้นมบุตร
๒. เพื่อให้ความอบอุ่นทารก
๓. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์มารดาทารก
๔. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการให้นมบุตรในที่สาธารณะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มารดาสามารถให้นมบุตรได้โดยไม่เปิดเผยร่างกาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ในการให้นมบุตร และส่งเสริมความสัมพันธ์มารดาทารก
๒. สามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายให้ทารกขณะดูนมมารดา
๓. มารดามีความมั่นใจในการให้นมบุตรในที่สาธารณะ